



Date : 28/03/2022

Herbophyl'hebdo : Un démarrage contrasté

► Pousse de la semaine

Malgré des sommes de températures élevées par rapport à l'année dernière, seule la bande littorale profite d'une pousse d'herbe conséquente. Un vent du Nord s'étant installé dans certaines zones, il handicape la pousse dans d'autres zones. La moyenne des croissances observées est de 29 Kg MS/ha/j, elle cache une forte hétérogénéité avec des pousses à l'intérieur de la région plus mitigées.


► Cumuls des températures depuis le 1^{er} février

Le tableau ci-dessous montre une avance de 77 °C par rapport à l'année dernière. Une grande amplitude thermique dans la journée empêche le développement de l'herbe dans notre région.

28/03/22	2021	2022	Différence	Evolution
Abbeville	361	451	90	81
Beauvais	333	406	73	67
Boulogne	364	470	106	87
Cambrai	351	429	78	81
Dunkerque	379	482	103	81
Lille	360	439	79	81
Reims	351	382	31	67
St Quentin	341	403	62	78
Sivry	320	393	73	78

► Gestion du pâturage

Le stade des 400 °C étant dépassé, la mise à l'herbe doit être effective pour tous les animaux. En effet, le déprimage est bénéfique pour éviter la montaison et limiter la fauche des refus ainsi que favoriser le développement des talles.




En ce moment, on applique les complémentations indiquées dans le tableau suivant :

	Ares/UGB :	10	15	20	30	40
Pousse de l'herbe Kg/MS/Ha	10	17 Kg MS	16 Kg MS	16 Kg MS	15 Kg MS	14 kg MS
	20	16 Kg MS	15 Kg MS	14 Kg MS	12 Kg MS	10 kg MS
	30	15 Kg MS	13 Kg MS	12 Kg MS	9 Kg MS	6 kg MS
	40	14 Kg MS	12 Kg MS	10 Kg MS	6 Kg MS	2 kg MS

► Gestion de la protéine

Le taux d'urée dans le lait est un bon indicateur d'équilibre de la ration. Celui-ci est élevé lorsqu'il y a un excès de MAT (protéines brutes >16%) dans la ration. Il faut réajuster la complémentation azotée. En période de pâturage, la variation est tout à fait acceptable puisque le taux varie en fonction de la pousse de l'herbe et des espèces pâturées dans chaque prairie. Il est tout de même important d'avoir un œil sur le taux d'urée afin d'adapter la complémentation. Le confort animal se situe entre 0.20 et 0.30 g/L. Pour interpréter le résultat, faire une moyenne de plusieurs prélèvements.



Les Herbophyles

Chambre d'agriculture	Aisne	Leborgne Gaëten	06 18 51 01 54
	Oise	Récopé Christelle	06 73 74 33 61
	Somme	Leroy Claire	06 86 37 56 68
	Nord	DeWilde Quentin	06 42 59 01 11
	Pas de Calais	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45
	Pas de Calais	Hennebelle Dany	06 84 57 93 24

Avenir Conseil Elevage	Nord	Gruener Sophie	06 84 95 94 39
Oxygen Conseil Elevage	Picardie	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91
	Pas de Calais	Bocquillon Jérémie	06 71 92 52 10